

Шкала	Складові	Інтерпретація результату
<p>DAS (Disease Activity Score)</p> <p>[Індекс Активності Захворювання]</p>	<p>в клінічній практиці зазвичай використовують індекс DAS-28; результат розраховують за допомогою спеціального калькулятора, який враховує:</p> <p>1) число припухлих суглобів</p> <p>2) число болючих суглобів (враховують 28 суглобів: суглоби зап'ястя, п'ястно-фалангові, проксимальні міжфалангові, ліктьові, плечові та колінні)</p> <p>3) ШОЕ або СРБ</p> <p>4) загальну оцінку активності захворювання пацієнтом за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ, 0–100)</p>	<p>діапазон можливих величин 0–9,4</p> <p>оцінка активності захворювання:</p> <p><2,6 балів — ремісія</p> <p>≤3,2 — низька активність</p> <p>>3,2 і ≤5,1 — середня активність</p> <p>>5,1 — висока активність</p> <p>оцінка відповіді на лікування:</p> <p>– добра — зміна активності на $\geq 1,2$ та низька активність</p> <p>– середня — зміна на $>0,6$ і $<1,2$ і активність низька або середня або зміна на $\geq 1,2$ і висока або середня активність</p> <p>– відповіді немає — зміна на $<0,6$ або на $<1,2$ і висока активність</p>
<p>SDAI (Simple Disease Activity Index)</p> <p>[Спрощений Індекс Активності Захворювання]</p>	<p>враховує ті ж суглоби, що DAS-28, але не вимагає застосування калькулятора</p> <p>величина SDAI = число болючих суглобів</p> <p>+ число припухлих суглобів</p> <p>+ загальна оцінка активності захворювання пацієнтом за шкалою ВАШ (0–10 см)</p> <p>+ загальна оцінка активності захворювання лікарем за шкалою ВАШ (0–10 см)</p> <p>+ рівень СРБ (0,1–10 мг/дл)</p>	<p>діапазон можливих величин 0,1–86</p> <p>оцінка активності захворювання:</p> <p>≤3,3 — ремісія</p> <p>≤11 — низька активність</p> <p>>11 і ≤26 — середня активність</p> <p>>26 — висока активність</p>

		<p>оцінка відповіді на лікування:</p> <ul style="list-style-type: none"> – значне покращення — зміна на >21 – середнє покращення — зміна на $10-21$ – покращення немає — зміна на ≤ 9
<p>CDAI (Clinical Disease Activity Index) [Клінічний Індекс Активності Захворювання]</p>	<p>ідентичний індексу SDAI, за винятком того, що не враховує СРБ</p>	<p>діапазон можливих величин $0,1-76$</p> <p>оцінка активності захворювання:</p> <ul style="list-style-type: none"> $\leq 2,8$ — ремісія ≤ 10 — низька активність >10 і ≤ 22 — середня активність >22 — висока активність
<p>Критерії ремісії згідно ACR/EULAR (Clinical Disease Activity Index) [Клінічний Індекс Активності Захворювання]</p>	<p>відповідність усім нижче наведеним критеріям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – число болючих суглобів ≤ 1 – число припухлих суглобів ≤ 1 – рівень СРБ (мг/дл) ≤ 1 – загальна оцінка активності захворювання пацієнтом за шкалою ВАШ (0–10) ≤ 1 або SDAI $\leq 3,3$ 	<p>рекомендовані EULAR для оцінки результативності лікування у клінічній практиці</p>