

• Оцінка за шкалою ком Глазго

Шкала для оцінки порушення свідомості та коми у дітей старших 4-х років і дорослих. Вона застосовується для різних категорій критичних пацієнтів. Зокрема шкала відноситься до пункту D загальноприйнятого алгоритму огляду ABCDE.

Активність

Оцінка

Відкривання очей

Відсутнє (навіть при натисканні на верхній край орбіти) 1

У відповідь на біль (біль при натисканні на грудину, кінцівку, верхній край орбіти) 2

У відповідь на мову (неспецифічна відповідь, не обов'язково на команду)

3

Спонтанне (очі відкриті, але хворий не обов'язково в свідомості) 4

Рухова відповідь (слід також мати на увазі, що реалізації рухових реакцій може заважати наявність плегії або парезу з однієї чи обох сторін)

Відсутня (на будь-який біль; кінцівки залишаються атонічними) 1

Розгинальна відповідь (приведення плеча, внутрішня ротація плеча та передпліччя) 2

Згинальна відповідь (реакція відсмикування або припущення про геміплегічну позу) 3

Відсмикування (відсмикування руки як спроба уникнути больового подразнення, відведення плеча) 4

Локалізація болю (рух рукою, спрямований на усунення тиснення на грудину або верхній край орбіти) 5

Виконання команд (виконання простих команд) 6

Мовна відповідь (при відсутності мови, «мовній нісенітниці» або невиконанні інструкцій при явно достатньому рівні притомності, слід мати на увазі можливість афатичних порушень)

<u>Відсутня</u> (відсутність будь-якої вербалізації)	1
<u>Нечленороздільна відповідь</u> (стогін, нечленороздільні звуки)	2
<u>Недоречна відповідь</u> (відповідь зрозуміла, але недоречна, відсутність зв'язаних речень)	3
<u>Сплутаність мови</u> (підтримує розмову, однак відповідь сплутана, дезорієнтована)	4
<u>Орієнтована відповідь</u> (підтримує розмову, адекватна відповідь)	5

Інтерпретація: відповідність рівня свідомості і сумарної оцінки по шкалі ком Глазго

- ✓ Ясна свідомість **15**
- ✓ Оглушення **13-14**
- ✓ Сопор **9-12**
- ✓ Кома **4-8**
- ✓ Смерть мозку **3**