

• Оцінка за Цинциннатівською догоспітальною шкалою інсульту (CPSS)

Це шкала із 3 пунктів, яка базується на спрощеній шкалі (NIHSS). Оцінювання за даною шкалою має дві основні мети. По-перше, це виявлення можливості інсульту в басейні середньої мозкової артерії. По-друге, якщо дві (або більше) зони є позитивними та поява симптомів відбувається у певний проміжок часу, застосування тромболітичної терапії може бути корисним та ефективним для пацієнта.

Під час оцінки лікар шукає три конкретні симптоми, які можуть вказувати на інсульт:

- Асиметрія обличчя
- Слабкість рук
- Невизначне або порушене мовлення

Цей тест складається з трьох частин: обличчя, рука та мова.

Обличчя: візуальний огляд рятувальником пацієнта та запитати у членів сім'ї, чи є якісь зміни у зовнішності пацієнта, чи є явне опущення кута рота/ока тощо, помічене респондентом під час обстеження.

Рука: попросіть пацієнта підняти руки протягом 10 секунд і задокументуйте результати.

Мова: попросіть пацієнта повторити просту фразу, таку як «Рання пташка ловить хробака»

Оцінка:

Обличчя:

- обидві сторони рухаються однаково
- одна сторона не рухається

Рука:

- обидві руки рухаються однаково
- одна рука не рухається

Мова:

- правильна вимова слів
- невизначно вимовлені слова, афазія чи інші проблеми з мовленням

Інтерпретація: якщо у пацієнта два та більше балів, можна запідозрити

інсульт, тому його потрібно негайно транспортувати в лікарню.