

Оцінка за шкалою Падуа

Шкала Padua служить прогностичним інструментом, створеним в Університеті м. Падуї для виявлення у нехірургічних хворих в умовах стаціонару, ризику тромбозу глибоких вен (ТГВ) і / або тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА).

Оціювальні ознаки	Кількість балів
Активне онкологічне захворювання (пацієнти з метастазами в регіональні лімфовузли або з віддаленими метастазами, які отримували хіміотерапію або променеву терапію протягом останніх 6 місяців)	3 бали
ТГВ або ТЕЛА в анамнезі (за винятком тромбозу поверхневих вен)	3 бали
Імобілізація (планується постільний режим [з можливістю користуватися ванною / туалетом] в зв'язку зі зниженою руховою мобільністю хворого або рекомендаціями лікаря протягом ≥ 3 днів)	3 бали
Діагностована тромбофілія (дефіцит антитромбіну, протеїну С або S, фактора V Лейдена, мутація G20210A гена протромбіну або антифосфоліпідний синдром)	3 бали
Недавня (≤ 1 міс.) травма або хірургічне втручання	2 бали
Вік ≥ 70 років	1 бал
Серцева або дихальна недостатність	1 бал
Гострий інфаркт міокарда або ішемічний інсульт	1 бал
Гостра інфекція або ревматологічне захворювання	1 бал
Ожиріння (ІМТ ≥ 30 кг/м ²)	1 бал
Лікування гормонами	1 бал

Інтерпретація: ≥ 4 балів – висока ймовірність тромбозу глибоких вен (ТГВ) і / або тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА)

<https://clincasequest.academy/padua-score/>