

- **Оцінка за скандинавською шкалою інсульту (SSS; Scandinavian Stroke Study Group)**

Для комбінованої оцінки ступеня тяжкості пацієнтів в гострому періоді інсульту та ефективності проведеного лікування, Європейська ініціатива по інсульту рекомендує також використовувати Скандинавську шкалу інсульту (SSS; Scandinavian Stroke Study Group).

Свідомість

- В ясній свідомості **(6 балів)**
- Сонливий, але може бути розбуджений до **ясної свідомості (4 бали)**
- Реагує на мовні команди, але не цілком у свідомості **(2 бали)**
- Кома або сопор (реакція тільки на біль) **(0 балів)**

Рух очних яблук

- Відсутність паралічу погляду **(4 бали)**
- Параліч погляду **(2 бали)**
- Поєднане відхилення очей **(0 балів)**

Рука, сила рухів (оцінюється тільки на ураженій стороні)

- Піднімання з нормальною силою **(6 балів)**
- Піднімання зі зниженою силою **(5 балів)**
- Підняття руки зі згинанням в лікті **(4 балів)**
- Рухи рукою можливі тільки в площині опори (без подолання сили тяжіння) **(2 балів)**
- Параліч **(0 балів)**

Кисть, сила рухів (оцінюється тільки на ураженій стороні)

- Нормальна сила **(6 балів)**
- Знижена сила рухів збережена в повному обсязі **(4 бали)**
- Деякі рухи кистю збережені, але пальці не можуть бути приведені до долоні **(2 бали)**
- Параліч **(0 балів)**

Нога, сила рухів (оцінюється тільки на ураженій стороні)

- Нормальна сила **(6 балів)**
- Піднімання випрямленою ногою зі зниженою силою **(5 балів)**
- Піднімання ноги зі згинанням в коліні **(4 бали)**
- Рухи ногою можливі тільки в площині опори (без подолання сили тяжіння) **(2 бали)**
- Параліч **(0 балів)**

Орієнтація

- Правильна в часі, місці, власної особистості **(6 балів)**
- Дві ознаки з перерахованих вище **(4 бали)**
- Одна ознака з перерахованих вище **(2 бали)**
- Повна дезорієнтація **(0 балів)**

Мова

- Відсутність афазії **(10 балів)**
- Обмеженість словникового запасу або безладна мова **(6 балів)**
- Більше ніж «так» / «ні» або менше **(0 балів)**

Параліч лиця

- Відсутній або сумнівний **(2 бали)**
- Є **(0 балів)**

Хода

- Може пройти 5 метрів без допомоги або опори (тростини) **(12 балів)**
- Може йти з опорою (тростиною) **(9 балів)**
- Може йти зі сторонньою допомогою **(6 балів)**
- Сидить без підтримки **(3 бали)**
- Прикутий до ліжка або крісла **(0 балів)**

Бали: _____

Бали складаються в суму з 10 перерахованих вище груп, де мінімальний бал – 0, максимальний – 60 (чим менше кількість балів, тим важчий стан пацієнта). Ефективність проведеної терапії інсульту оцінюється за ступенем поліпшення загального стану, що включає в себе швидкість регресу неврологічної симптоматики, яку визначають за допомогою неврологічного огляду, лабораторних та функціональних методів дослідження:

- ✓ **значне поліпшення стану** – регрес неврологічної симптоматики на 10 і більше балів
- ✓ **помірне поліпшення** – регрес неврологічного дефіциту менше ніж на 10 балів
- ✓ **незначне поліпшення** – мінімальний регрес неврологічної симптоматики (1-2 бали)