

### Оцінка за правилом PERC для виключення ТЕЛА

Правило можна використовувати, якщо пацієнт має низький ризик ТЕЛА (претестова ймовірність <15%). Для таких пацієнтів з низькою претестовою ймовірністю ТЕЛА ризик, пов'язаний з початком обстеження та лікування ТЕЛА (наприклад, КТ-опромінення, анафілаксія від введення контрастної речовини, кровотеча при використанні антикоагулянтів), є еквівалентним ймовірності пропуску діагнозу.

Параметр	Критерій
Вік $\geq 50$ років	1
ЧСС $\geq 100$	1
O <sub>2</sub> при кімнатній температурі <95%	1
Односторонній набряк ніг	1
Кровохаркання	1
Нещодавня операція чи травма Операція або травма $\leq 4$ тижнів тому, що потребує лікування під загальною анестезією	1
Попередня ТЕЛА або ТГВ	1
Використання гормонів Використання оральних контрацептивів, замісної гормональної терапії або естрогенів у чоловіків чи жінок	1

#### *Інтерпретація:*

Якщо присутні/є якісь параметри з наступного, то не можна виключати ТЕЛА.

Кількість критеріїв	Рекомендація
---------------------	--------------

<p>0 критеріїв за правилом PERC для легеневої емболії</p>	<p>Відсутня потреба в подальшому обстеженні, оскільки ймовірність ТЕЛА &lt;2%. Якщо жоден із критеріїв не є позитивним, а претестова клінічна ймовірність &lt;15%, критерії правила PERC задовольняються.</p>
<p>1-8 критеріїв за правилом PERC для легеневої емболії</p>	<p>Якщо будь-який критерій є позитивним – правило PERC не можна використовувати для виключення ТЕЛА у даного пацієнта.</p>

<https://clincasequest.academy/perc-rule/>