

• **Оцінка за Лос-Анджелеським догоспітальним скринінгом інсульту**

LAPSS (Лос-Анджелеський догоспітальний скринінг інсульту) розроблена з метою швидко ідентифікувати на догоспітальному етапі найчастіші типи пацієнтів з інсультом та виключити стани, що імітують ГПМК.

При оцінці за LAPSS на догоспітальному етапі виявляється одностороння слабкість м'язів обличчя, слабкість м'язів руки та/або хватки і дефіцит моторики.

Критерії обстеження для виявлення інсульту на догоспітальному етапі:	Так	Невідомо	Ні
1. Вік пацієнта >45 років.			
2. Не має в анамнезі судом/епілепсії.			
3. Тривалість симптомів < 24 годин.			
4. Пацієнт не прикутий до ліжка чи інвалідного візка на початковому етапі.			
5. Рівень глюкози в крові становить 3,3-30,0 ммоль/л.			
6. Огляд пацієнта для виявлення ознак асиметрії:			
	Норма	Права сторона	Ліва сторона
Посмішка / гримаса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> опущена	<input type="checkbox"/> опущена
Сила в руках	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> опускається донизу <input type="checkbox"/> швидко падає	<input type="checkbox"/> опускається донизу <input type="checkbox"/> швидко падає
Хватка (утримання в руці)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> слабка хватка <input type="checkbox"/> хватка відсутня	<input type="checkbox"/> слабка хватка <input type="checkbox"/> хватка відсутня

Інтерпретація: Якщо в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 скрізь "так" або "невідомо", то у пацієнта можна припустити ГПМК.

*у пацієнта все ще може бути інсульт, навіть коли він не відповідає критеріям LAPSS.