

Оцінка за 4-рівневою шкалою клінічної ймовірності (4PEPS, 4-Level Pulmonary Embolism Clinical Probability Score)

4-рівнева шкала клінічної ймовірності (4PEPS, 4-Level Pulmonary Embolism Clinical Probability Score) призначена для того, щоб допомогти лікарям відділення невідкладної допомоги приймати рішення щодо пацієнтів із підозрою на ТЕЛА.

Ознака	Варіанти	Бали
Вік(років)	<50	- 2
	50-64	- 1
	> 64	0
Стать	Жіночий	0
	Чоловік	+2
Хронічне респіраторне захворювання	Ні	0
	Так	-1
Частота пульсу <80	Ні	0
	Так	-1
Біль у грудях та гостра задишка	Ні	0
	Так	+1
Поточне вживання естрогенів	Ні	0
	Так	+2
Попередній анамнез ВТЕ	Ні	0

	Так	+2
Непритомність, синкопальний стан	Ні	0
	Так	+2
Нерухомість протягом останніх чотирьох тижнів, хірургічне втручання, гіпсова пов'язка на нижню кінцівку або прикутість до ліжка > 3 днів через гостре захворювання протягом останніх чотирьох тижнів	Ні	0
	Так	+2
Насичення O ₂ крові <95%	Ні	0
	Так	+3
Біль в гомілці та/або односторонній набряк нижніх кінцівок	Ні	0
	Так	+3
ТЕЛА – найімовірніший діагноз	Ні	0
	Так	+5

Інтерпретація:

Оцінка	Клінічна ймовірність ТЕЛА	Діагностика
--------	---------------------------	-------------

<0	Дуже низька клінічна претестова вірогідність (<2%)	ТЕЛА можна виключити
0-5	Низька клінічна претестова вірогідність (2-20%)	ТЕЛА можна виключити, якщо рівень D-димеру <1,0 мкг/мл
6-12	Помірна клінічна претестова вірогідність (20-65%)	ТЕЛА може бути виключена, якщо рівень D-димеру <0,5 мкг/мл АБО <(вік x 0,01) мкг/мл
≥13	Висока клінічна претестова вірогідність (>65%)	Неможливо виключити ТЕЛА без візуалізації

<https://clincasequest.academy/4peps/>