

- **Оцінка за шкалою розпізнавання інсульту у відділенні невідкладної допомоги (ROSIER)**

ROSIER - це інструмент розпізнавання інсульту із 7 пунктів (від -2 до +5 балів), який базується на історії хвороби та неврологічних ознаках. Результат +1 бал або вище є достатнім для встановлення діагнозу «інсульт» або "транзиторна ішемічна атака". Вона використовується для розрізнення підозри на інсульт від станів, що імітують інсульт, і була розроблена для швидкої діагностики підозрілих інсультів, щоб гарантувати ідентифікацію пацієнтів у вікні тромболізу, наскільки це можливо.

Пацієнти з підозрою на ТІА (симптоми минають за 24 години) повинні бути додатково оцінені щодо ризику наступного інсульту за шкалою ABCD².

Шкала ROSIER		
Чи була втрата свідомості або синкопе?	<input type="checkbox"/> Так -1	<input type="checkbox"/> Ні 0
Чи була судомна активність?	<input type="checkbox"/> Так -1	<input type="checkbox"/> Ні 0
Чи є новий напад (або пробудження від сну)?		
I. Асиметрична слабкість обличчя	<input type="checkbox"/> Так +1	<input type="checkbox"/> Ні 0
II. Асиметрична слабкість руки	<input type="checkbox"/> Так +1	<input type="checkbox"/> Ні 0
III. Асиметрична слабкість ніг	<input type="checkbox"/> Так +1	<input type="checkbox"/> Ні 0
IV. Порухення мовлення	<input type="checkbox"/> Так +1	<input type="checkbox"/> Ні 0
V. Дефект поля зору	<input type="checkbox"/> Так +1	<input type="checkbox"/> Ні 0

Інтерпретація:

- Якщо оцінка > 0 балів — результат оцінюється як можливий інсульт.
- Якщо оцінка ≤ 0 балів — інсульт малоімовірний, але не повністю виключений!